


Q11 * Mathematik

Axiomatische Definition der Wahrscheinlichkeit nach Kolmogorow

Def.: Ist Ω eine Ergebnismenge, dann heißt eine Funktion P , die jedem Ereignis $E \subset \Omega$ genau eine reelle Zahl $P(E)$ zuordnet, ein **Wahrscheinlichkeitsverteilung** (oder auch Wahrscheinlichkeitsmaß), wenn folgende drei Bedingungen erfüllt sind:

- (1) $P(E) \geq 0$ für jedes $E \subset \Omega$
- (2) $P(\Omega) = 1$
- (3) Für $E_1, E_2 \subset \Omega$ mit $E_1 \cap E_2 = \emptyset$ gilt:
 $P(E_1 \cup E_2) = P(E_1) + P(E_2)$



Man sagt, P ist ein **nicht negatives** (1), **normiertes** (2), **additives** (3) Maß.

Beachte:

- ▶ Zu einer Ergebnismenge Ω kann es viele verschiedene Wahrscheinlichkeitsmaße geben.
- ▶ Wegen (3) ist P schon eindeutig festgelegt, wenn man $P(\{\omega\})$ nur für alle Elementarereignisse $\{\omega\}$ angibt.

Aufgabe:

Geben Sie zum Zufallsexperiment „Wurf eines Würfels“ mit $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ zwei verschiedene Wahrscheinlichkeitsmaße an.

Bestimmen Sie anschließend jeweils $P(\text{„ungerade Zahl“})$.

ω	1	2	3	4	5	6
$P(\{\omega\})$						

ω	1	2	3	4	5	6
$P(\{\omega\})$						

$P(\text{„ungerade Zahl“}) =$

$P(\text{„ungerade Zahl“}) =$

Def.: Man spricht von einem so genannten **„Laplace-Experiment“**, wenn allen Elementarereignissen die gleiche Wahrscheinlichkeit zugeordnet wird.

Es gilt dann:

$$P(E) = \frac{|E|}{|\Omega|} = \frac{\text{Anzahl der für E günstigen Fälle}}{\text{Anzahl der möglichen Fälle}}$$

Aufgaben:

1. Ein „Laplace-Würfel“ wird 6-mal geworfen.

Mit welcher Wahrscheinlichkeit treten folgende Ereignisse auf?

- a) $E_1 = \text{„Keine 6“}$
- b) $E_2 = \text{„Genau eine 6“}$
- c) $E_3 = \text{„Höchstens eine 6“}$
- c) $E_4 = \text{„Jede Zahl genau einmal“}$

2. Zwei „Laplace-Würfel“ werden gleichzeitig geworfen.


Mit welcher Wahrscheinlichkeit treten folgende Ereignisse auf?

- a) $E_1 = \text{„Augensumme 12“}$
- b) $E_2 = \text{„Augensumme 7“}$
- c) $E_3 = \text{„Augensumme 6“}$
- d) $E_4 = \text{„zwei unterschiedliche Zahlen“}$
- e) $E_5 = \text{„Augendifferenz 1“}$
- f) $E_6 = \text{„Augendifferenz 4“}$
- g) $E_7 = \text{„Augendifferenz } > 3 \text{“}$
- h) $E_8 = \text{„Augenprodukt 6“}$
- i) $E_9 = \text{„Augenprodukt 4“}$
- k) $E_{10} = \text{„Augenprodukt } < 5 \text{“}$
- l) $E_{11} = \text{„eine ungerade und eine gerade Zahl“}$



Q11 * Mathematik

Axiomatische Definition der Wahrscheinlichkeit nach Kolmogorow



Lösungen:

z.B.

ω	1	2	3	4	5	6
$P(\{\omega\})$	0,1	0,1	0,3	0,1	0,3	0,1

ω	1	2	3	4	5	6
$P(\{\omega\})$	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6	1/6

$$P(\text{„ungerade Zahl“}) = 0,1+0,3+0,3 = 0,7$$

$$P(\text{„ungerade Zahl“}) = 3/6 = 0,5$$

Aufgaben:

1. $\Omega = \{ (111111), (111112), (111113), \dots, (666666) \}$ und $|\Omega| = 6^6 = 46656$

a) $P(\text{„Keine 6“}) = \frac{5^6}{6^6} = \frac{15625}{46656} \approx 33,5\%$

b) $P(\text{„Genau eine 6“}) = \frac{6 \cdot 5^5}{6^6} = \frac{18750}{46656} \approx 40,2\%$

c) $P(\text{„Höchstens eine 6“}) = P(\text{„Keine 6“}) + P(\text{„Genau eine 6“}) = \frac{5^6 + 6 \cdot 5^5}{6^6} = \frac{15625 + 18750}{46656} \approx 33,5\% + 40,2\% = 73,7\%$

d) $P(\text{„Jede Zahl genau einmal“}) = \frac{6 \cdot 5 \cdot 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1}{6^6} = \frac{720}{46656} \approx 1,5\%$

2. $\Omega = \{ (11), (12), (13), (14), (15), (16), (21), \dots, (66) \}$ und $|\Omega| = 6^2 = 36$

a) $P(\text{„Augensumme 12“}) = \frac{1}{6^2} = \frac{1}{36} \approx 2,8\%$

b) $P(\text{„Augensumme 7“}) = \frac{2 \cdot 3}{36} = \frac{6}{36} \approx 16,7\%$

c) $P(\text{„Augensumme 6“}) = \frac{2 \cdot 2 + 1}{36} = \frac{5}{36} \approx 13,9\%$

d) $P(\text{„2 unterschiedl. Zahlen“}) = 1 - P(\text{„2 gleiche Zahlen“}) = 1 - \frac{6}{36} = \frac{30}{36} \approx 83,3\%$

e) $P(\text{„Augendifferenz 1“}) = \frac{2 \cdot 5}{36} = \frac{10}{36} \approx 27,8\%$

f) $P(\text{„Augendifferenz 4“}) = \frac{2 \cdot 2}{36} = \frac{4}{36} \approx 11,1\%$

g) $P(\text{„Augendifferenz } > 3\text{“}) = \frac{2 \cdot 2}{36} + \frac{2 \cdot 1}{36} = \frac{6}{36} \approx 16,7\%$

h) $P(\text{„Augenprodukt 6“}) = \frac{2 \cdot 2}{36} = \frac{4}{36} \approx 11,1\%$

i) $P(\text{„Augenprodukt 4“}) = \frac{2+1}{36} = \frac{3}{36} \approx 8,3\%$

k) $P(\text{„Augenprodukt } < 5\text{“}) = \frac{1+2+2+3}{36} = \frac{8}{36} \approx 22,2\%$

l) $P(\text{„eine ungerade und eine gerade Zahl“}) = \frac{3 \cdot 3 + 3 \cdot 3}{36} = \frac{18}{36} = 50,0\%$

